



HAUTE ET MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CROIX-FONSOMMES ET ABBEVILLE (Identifiant national : 220320034)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 80VDS201)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FLIPO S.), - 220320034, HAUTE ET MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CROIX-FONSOMMES ET ABBEVILLE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 52P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/220320034.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FLIPO S.)

Centroïde calculé : 619088°-2546493°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 04/08/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 17 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 17 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 17 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 19 |
| 6. HABITATS | 19 |
| 7. ESPECES | 23 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 49 |
| 9. SOURCES | 52 |

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [220320019](#) - (Id reg. : 80VDS109)
- Id nat. : [220030040](#) - (Id reg. : 022222)

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Département : Somme
- Commune : Péronne (INSEE : 80620)
- Commune : Éclusier-Vaux (INSEE : 80264)
- Commune : Eppeville (INSEE : 80274)
- Commune : Saint-Christ-Briost (INSEE : 80701)
- Commune : Tugny-et-Pont (INSEE : 02752)
- Commune : Ollezy (INSEE : 02570)
- Commune : Daours (INSEE : 80234)
- Commune : Doingt (INSEE : 80240)
- Commune : Maricourt (INSEE : 80513)
- Commune : Longpré-les-Corps-Saints (INSEE : 80488)
- Commune : Longueau (INSEE : 80489)
- Commune : Hem-Monacu (INSEE : 80428)
- Commune : Moyenneville (INSEE : 80578)
- Commune : Belloy-sur-Somme (INSEE : 80082)
- Commune : Bray-lès-Mareuil (INSEE : 80135)
- Commune : Chipilly (INSEE : 80192)
- Commune : Cugny (INSEE : 02246)
- Commune : Harly (INSEE : 02371)
- Commune : Neuville-lès-Bray (INSEE : 80593)
- Commune : Francières (INSEE : 80344)
- Commune : Cerisy (INSEE : 80184)
- Commune : Vaire-sous-Corbie (INSEE : 80774)
- Commune : Rivery (INSEE : 80674)
- Commune : Hombleux (INSEE : 80442)
- Commune : Bourdon (INSEE : 80123)
- Commune : Béthencourt-sur-Somme (INSEE : 80097)
- Commune : Falvy (INSEE : 80300)
- Commune : Picquigny (INSEE : 80622)
- Commune : Ennemain (INSEE : 80267)
- Commune : Sailly-le-Sec (INSEE : 80694)
- Commune : Dallon (INSEE : 02257)
- Commune : Pithon (INSEE : 02604)
- Commune : Ham (INSEE : 80410)
- Commune : Mareuil-Caubert (INSEE : 80512)
- Commune : Amiens (INSEE : 80021)
- Commune : Athies (INSEE : 80034)
- Commune : Aubigny (INSEE : 80036)
- Commune : Brie (INSEE : 80141)
- Commune : Yzeux (INSEE : 80835)
- Commune : Biaches (INSEE : 80102)
- Commune : Breilly (INSEE : 80137)
- Commune : Condé-Folie (INSEE : 80205)
- Commune : Chuignes (INSEE : 80194)
- Commune : Cocquerel (INSEE : 80200)
- Commune : Pont-Remy (INSEE : 80635)
- Commune : Éterpigny (INSEE : 80294)
- Commune : Eaucourt-sur-Somme (INSEE : 80262)
- Commune : Épénancourt (INSEE : 80272)
- Commune : Flixecourt (INSEE : 80318)
- Commune : Essigny-le-Petit (INSEE : 02288)

- Commune : Happencourt (INSEE : 02367)
- Commune : Omissy (INSEE : 02571)
- Commune : Hamel (INSEE : 80411)
- Commune : Hangest-sur-Somme (INSEE : 80416)
- Commune : Vecquemont (INSEE : 80785)
- Commune : Villecourt (INSEE : 80794)
- Commune : Glisy (INSEE : 80379)
- Commune : Cappy (INSEE : 80172)
- Commune : Proyard (INSEE : 80644)
- Commune : Sancourt (INSEE : 80726)
- Commune : Voyennes (INSEE : 80811)
- Commune : Yonval (INSEE : 80836)
- Commune : Corbie (INSEE : 80212)
- Commune : Érondelle (INSEE : 80282)
- Commune : Contescourt (INSEE : 02214)
- Commune : Annois (INSEE : 02019)
- Commune : Saint-Quentin (INSEE : 02691)
- Commune : Fouilloy (INSEE : 80338)
- Commune : Suzanne (INSEE : 80743)
- Commune : Morcourt (INSEE : 80569)
- Commune : Abbeville (INSEE : 80001)
- Commune : Liercourt (INSEE : 80476)
- Commune : Long (INSEE : 80486)
- Commune : Saint-Vaast-en-Chaussée (INSEE : 80722)
- Commune : Chuignolles (INSEE : 80195)
- Commune : Dreuil-lès-Amiens (INSEE : 80256)
- Commune : Remaucourt (INSEE : 02637)
- Commune : Seraucourt-le-Grand (INSEE : 02710)
- Commune : Sommette-Eaucourt (INSEE : 02726)
- Commune : Hamelet (INSEE : 80412)
- Commune : Morlancourt (INSEE : 80572)
- Commune : Frise (INSEE : 80367)
- Commune : Lamotte-Brebière (INSEE : 80461)
- Commune : Camon (INSEE : 80164)
- Commune : Chaussée-Tirancourt (INSEE : 80187)
- Commune : Saint-Sauveur (INSEE : 80718)
- Commune : Villers-Carbonnel (INSEE : 80801)
- Commune : Cizancourt (INSEE : 80197)
- Commune : Cléry-sur-Somme (INSEE : 80199)
- Commune : Offoy (INSEE : 80605)
- Commune : Pargny (INSEE : 80616)
- Commune : Saint-Simon (INSEE : 02694)
- Commune : Morcourt (INSEE : 02525)
- Commune : Fonsomme (INSEE : 02319)
- Commune : Fontaine-lès-Clercs (INSEE : 02320)
- Commune : Castres (INSEE : 02142)
- Commune : Grugies (INSEE : 02359)
- Commune : Clastres (INSEE : 02199)
- Commune : Rouvroy (INSEE : 02659)
- Commune : Crouy-Saint-Pierre (INSEE : 80229)
- Commune : Curlu (INSEE : 80231)
- Commune : Mesnil-Bruntel (INSEE : 80536)
- Commune : Fontaine-sur-Somme (INSEE : 80328)
- Commune : Ailly-sur-Somme (INSEE : 80011)
- Commune : Buire-Courcelles (INSEE : 80150)
- Commune : Cartigny (INSEE : 80177)
- Commune : Sorel-en-Vimeu (INSEE : 80736)
- Commune : Bailleul (INSEE : 80051)
- Commune : Étinehem (INSEE : 80295)
- Commune : Étoile (INSEE : 80296)
- Commune : Feuillères (INSEE : 80307)
- Commune : Épagne-Épagnette (INSEE : 80268)
- Commune : Sailly-Laurette (INSEE : 80693)

- Commune : Jussy (INSEE : 02397)
- Commune : Homblières (INSEE : 02383)
- Commune : Artemps (INSEE : 02025)
- Commune : Dury (INSEE : 02273)
- Commune : Lesdins (INSEE : 02420)
- Commune : Flavy-le-Martel (INSEE : 02315)
- Commune : Gauchy (INSEE : 02340)
- Commune : Méricourt-sur-Somme (INSEE : 80532)
- Commune : Vaux-sur-Somme (INSEE : 80784)
- Commune : Argœuves (INSEE : 80024)
- Commune : Blangy-Tronville (INSEE : 80107)
- Commune : Bray-sur-Somme (INSEE : 80136)

1.2 Superficie

16280,87 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5

Maximale (mètre): 93

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [220320019](#) - LARRIS ET BOIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE DREUIL-LÈS-AMIENS ET CROUY-SAINT-PIERRE (Type 1) (Id reg. : 80VDS109)
- Id nat. : [220030040](#) - Tourbières et marais de la vallée de la Somme à Happencourt et Seraucourt-le-Grand (Type 1) (Id reg. : 022222)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Cette zone correspond à la grande vallée tourbeuse alcaline de la Somme, unique en Europe. L'éventail des habitats aquatiques, amphibies, hygrophiles à mésohygrophiles, est particulièrement développé dans le fond de vallée. L'ensemble de la vallée joue un rôle évident de corridor fluvial, favorable aux flux migratoires de multiples espèces végétales et animales. De l'amont vers l'aval, se succèdent des influences subcontinentales à atlantiques, expliquant en partie l'extrême biodiversité observée. Sur le plan géomorphologique, la Somme présente ici un exemple typique et exemplaire de large vallée tourbeuse en "U" à faible pente.

Les versants en continuité caténale permettent d'accroître encore la diversité coenotique. Dans la zone de méandres, les versants offrent, par le jeu des concavités et des convexités, un ensemble diversifié et original d'éboulis, de pelouses, d'ourlets et de fourrés calcicoles, opposant les versants froids aux versants bien exposés, où se mêlent les caractères thermophiles et submontagnards.

--> Les différents tronçons du fond de vallée sont décrits ci-après :

* De Croix Fonsommes à Ham

Les sources de la Somme se situent au milieu du plateau agricole du Vermandois, à Croix-Fonsommes. Le fleuve s'écoule globalement dans la direction nord-ouest/sud-est. Deux principales zones s'individualisent : les marais d'Isle et d'Harly et les marais de Saint-Simon, qui représentent deux vastes zones marécageuses d'intérêt patrimonial élevé.

* De Voyennes à Corbie

La Somme s'écoule d'abord entre Voyennes et Péronne, selon un axe nord/sud, dans une vallée très peu méandrée, étroite et qui s'encaisse faiblement dans le plateau crayeux. A l'aval de Péronne, la Somme change brusquement de direction pour adopter une orientation globalement est-ouest. Cette portion de vallée se caractérise par un encaissement puissant du cours du fleuve dans sa vallée et par une succession de méandres très marqués. Cette géomorphologie est héritée de la fin de la période glaciaire, à une époque où l'action conjuguée des eaux et des alternances gel / dégel donnait au cours d'eau un pouvoir de creusement sans commune mesure avec ce que l'on observe aujourd'hui.

Les milieux et les paysages ont été fortement influencés par l'homme depuis l'époque romaine, période à partir de laquelle la construction de chaussées-barrages s'est développée. Ces digues, qui permettaient de franchir la vallée, retenaient également les eaux en amont. C'est grâce à ces retenues que les milieux aquatiques et amphibies ont acquis un tel développement.

Ce tronçon est touché par le manque d'entretien quasi-généralisé du fond de vallée, conduisant à la fermeture des milieux par boisement, par envasement et par disparition des dernières prairies tourbeuses. Le paysage, qui était autrefois façonné par l'extraction de la tourbe, à des fins de combustible domestique, et par la récolte des roseaux, était composé d'étangs, de tourberies et de marais fauchés et pâturés. Aujourd'hui, la vallée est constituée de tremblants, de roselières et de forêts alluviales (bois tourbeux à saules, aulnes et bouleaux). Cette dynamique s'accompagne localement un processus d'acidification de la tourbe basique et forme un complexe original d'habitats acidoclines à acidiphiles.

* De Corbie à Amiens

Ce tronçon comprend notamment les marais de Daours/Corbie, le marais de Blangy-Tronville, les marais de Glisy, de Camon et les hortillonages. Ce secteur correspond à un vaste ensemble marécageux, comprenant une mosaïque de biotopes tourbeux alcalins, à caractère subatlantique/subcontinental. Il présente une morphologie et des affinités biogéographiques intermédiaires entre la basse vallée élargie et sublinéaire et la moyenne vallée méandreuse. Il se compose de prairies humides, de roselières, de bas-marais tourbeux, de plans d'eau et de boisements humides.

* D'Amiens à Abbeville

Entre Amiens et Breilly, les très nombreux plans d'eau aux formes géométriques résultent de l'exploitation récente de granulats. Dans les espaces hors plans d'eau, quelques roselières, quelques mégaphorbiaies et des fragments de bas-marais tourbeux se partagent le territoire. Ce secteur présente de fortes potentialités, peu exprimées actuellement compte-tenu de l'utilisation du site.

Entre Breilly et Yzeux, le fond de vallée conserve un caractère plus naturel que le précédent secteur. Les plans d'eau trouvent leur origine dans l'exploitation ancienne de la tourbe.

Entre Hangest-sur-Somme et Fontaine-sur-Somme, le paysage comprend un ensemble d'étangs de grande superficie, résultant de l'extraction de matériaux alluvionnaires. Ces étangs sont entourés de végétations arbustives ou arborescentes, de plantations de peupliers, de mégaphorbiaies ainsi que de quelques fragments de prairies, de bas-marais et de roselières.

Entre Fontaine-sur-Somme et Pont-Rémy, le paysage est davantage vouée à une activité agricole : prairies de fauche relictuelles, mais néanmoins remarquables, et prairies mésophiles pâturées occupent le territoire.

Entre Eaucourt-sur-Somme et Abbeville, un complexe exceptionnel d'étangs, de roselières, de bas-marais tourbeux et de prairies humides tourbeuses prend place. Ce secteur accueille, en particulier, les dernières prairies à Fritillaire pintade*.

--> Les versants de la vallée de la Somme, entre Péronne et Abbeville, ainsi que les versants des vallées attenantes comprennent un réseau de pelouses calcicoles et de boisements. Les versants s'inscrivent dans les craies blanches du Turonien, du Coniacien, du Santonien et du Campanien inférieur.

Les principaux sites se succèdent de la manière suivante, d'amont en aval :

- les coteaux de Frise et d'Eclusier-Vaux ;
- le "Mont Clairon", intégrant les versants surplombant « la Tourbière » à Cappy et ceux développés le long de la "Vallée de l'Enfer" ;
- le coteau du "Gros Mont", surplombant le "Marais du Couchant" ;
- l'ensemble de coteaux situés sur la rive droite de la Somme, entre Etinehem et Chipilly ;
- les coteaux du « Bois des Célestins », comprenant les bois attenants et les coteaux surplombant l'« Etang du Brache » et le "Marais Gobet" ;
- les larris relictuels situés sur les versants des vallées sèches "Bois de Tilloy" et "le Martimont" ;
- le vallon d'« Ornival » situé à l'ouest de Sailly-le-Sec ;
- les larris relictuels situés sur le versant de la vallée sèche "Vallée du Bosquet Duval", à l'est de Vaux-sur-Somme,
- les coteaux de "la Terrière" et de "la Falaise", surplombant le marais de la Barette à Corbie ;
- les larris de "la Falaise", entre Daours et Corbie ;
- les larris de la vallée d'Acon ;
- les larris de Picquigny et de ses environs ;
- les larris entre Bourdon et Yzeux ;
- les larris d'Hangest-sur-Somme ;
- les larris entre l'Etoile et Long ;
- les larris entre Longpré-les-Corps-Saints et Liercourt ;
- les « Monts de Caubert. »

Certains larris sont colonisés par les Genévriers communs (*Juniperus communis*), ce qui témoigne de l'utilisation pastorale ancestrale des coteaux de la vallée de la Somme. Aujourd'hui, la végétation de certains larris est maintenue rase grâce à l'activité des Lapins de garenne. Certains facies pelousaires sont favorisés par ces activités cuniculigènes, notamment les banquettes à Héliantheme nummulaire (*Helianthemum nummularium*). Des éboulis crayeux s'observent également. L'évolution spontanée de la végétation vers le boisement est localement accélérée par des plantations diverses (pins, feuillus).

Un grand nombre de groupements végétaux s'expriment dans le fond et sur les versants de la vallée. On trouvera la liste des principaux groupements ci-après.

--> Les milieux aquatiques et amphibies sont très diversifiés. On notera la présence, dans les étangs et les fossés :

- des herbiers pionniers à Characées (*Charetalia hispidae*) ;
- des herbiers flottants du Lemnion gibbae (dont *Lemno-Spirodeletum polyrhizae*) ;
- des herbiers bryophytiques flottants du Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae ;
- des herbiers flottants de l'Hydrocharition morsus-ranae (dont *Lemno trisulcae-Utricularietum vulgaris*) ;
- des herbiers du Scordio scorpioidis-Utricularion minoris (*Sparganietum minimi*) ;

- des herbiers à nénuphars du *Nymphaeion albae* (dont *Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae*) ;
- des herbiers submergés du *Potametalia pectinati* (*Potamo berchtoldii-Najadetum marinae*, *Potametum colorati*, groupement à *Groenlandia densa*, groupement à *Myriophyllum verticillatum*, groupement à *Potamogeton pectinatus*, à *Elodea canadensis*, à *Ceratophyllum demersum* ...) ;
- des herbiers du *Ranunculion aquatilis* (*Hottonietum palustris*, groupement à *Callitriche obtusangula* ...) ;
- des herbiers du *Ranunculion fluitantis* (*Sparganio emersi-Potametum pectinati*, groupement à *Sagittaria sagittifolia* ...) ;
- des herbiers d'atterrissement de l'*Hippuridetum vulgaris* ;
- des banquettes amphibies du *Glycerio-Sparganion* ;
- des végétations amphibies des bords de mares de l'*Oenanthion aquaticae* ;
- des groupements amphibies oligo-mésotrophes de l'*Hydrocotylo vulgaris-Baldellion ranunculoidis* ;
- des végétations pionnières des rives tourbeuses du *Cyperion flavescenti-fusci* (*Cyperetum flavescenti-fusci*) ;
- des végétations des dépressions peu profondes du *Rorippo amphibiae-Oenanthetum aquaticae* ;
- du gazon subcontinental de l'*Eleocharietum acicularis*.

--> Les végétations terrestres du fond de vallée comprennent :

- des roselières tourbeuses du *Thelypterido palustris-Phragmitetum* et du *Lathyro palustris-Lysimachietum* ;
- des roselières du *Phragmition australis* (dont *Solano dulcamarae-Phragmitetum*) ;
- des roselières du *Scirpo lacustris-Phragmitetum* ;
- des cladaies turficoles ;
- des mégaphorbiaies turficoles du *Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae* ;
- des mégaphorbiaies eutrophes du *Calystegion sepium* ;
- des cariçaies rivulaires du *Caricetum elatae*, du *Caricetum ripario-acutiformis*, du *Caricetum paniculatae* et du *Caricetum pseudocyper* ;
- des cariçaies tourbeuses du *Caricion rostratae* ;
- des cariçaies continentales du *Cicuto virosae-Caricetum pseudocyper* ;
- des bas-marais tourbeux alcalins de l'*Hydrocotylo-Schoenion* (*Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi*) ;
- des bas-marais tourbeux alcalins du *Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae* ;
- des prairies hygrophiles du *Mentho aquaticae-Juncion inflexi* (*Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi*) ;
- des prés inondés de l'*Oenanthion fistulosae* (*Eleocharo palustris-Oenanthetum fistulosae*) ;
- des prairies oligotrophes du *Molinion* (*Selino carvifoliae-Juncetum subnodulosi*) ;
- des prés de fauche subhygrophiles du *Colchico autumnalis-Arrhenatherion elatioris* ;
- des prés de fauche mésophiles du *Centaureo jaceae-Arrhenatherion elatioris* ;
- des prairies mésophiles du *Lolio-Cynosurion cristati* ;

- des aulnaies-frênaies de l'Alno-Padion (*Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae*) ;
- des boulaies à Sphaignes du *Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis*, habitats acidophiles ombrogènes ;
- des boisements du *Ribo nigri-Alnetum glutinosae* dans les parties tourbeuses ;
- des aulnaies humides à grandes laïches ;
- de l'Alno-Salicetum cinereae pour les fourrés rivulaires ;
- de l'Irido pseudacori-Alnetum sur les sols minéraux et eutrophes ;
- des ourlets eutrophes de l'*Aegopodion podagrariae*.

--> Les groupements végétaux représentés sur les coteaux calcaires sont les suivants :

- des pelouses calcicoles rases de l'*Avenulo pratensis-Festucetum lemanii* subass. *polygaletosum calcarae* ;
- des pelouses marnicoles de l'*Avenulo pratensis-Festucetum lemanii* subass. *blackstonietosum perfoliatae* ;
- des pelouses calcicoles rases thermophiles de l'*Avenulo pratensis-Festucetum lemanii* subass. *seselietosum montani* ;
- des pelouses calcicoles rases présentant des affinités submontagnardes de l'*Avenulo pratensis-Festucetum lemanii* subass. *anthericetosum ramosi* ;
- des pelouses de l'*Avenulo pratensis-Festucetum lemanii* var. submontagnarde à *Seseli libanotis* ;
- des facies cuniculigènes à Héliantheme nummulaire (*Helianthemum nummularium*) et à Epipactis brun rouge (*Epipactis atrorubens*) ;
- des éboulis crayeux à Epervière tachetée (*Hieracium maculatum*) et à Laitue vivace (*Lactuca perennis*) du *Leontodontion hyoseroidis*, uniquement représentés sur le coteau de Frise/Eclusier-Vaux ;
- des éboulis crayeux du *Resedo luteae-Chaenorhinetum minoris* ;
- des pelouses "mobiles" à Séslerie bleuâtre (*Sesleria caerulea*), du *Rumici acetosae-Seslerietum caeruleae*, uniquement représentées sur le coteau de Frise/Eclusier-Vaux ;
- des ourlets calcicoles du *Trifolion medii* (*Centaureo nemoralis-Origanetum vulgare*), parfois sous facies de brachypodiaies denses ;
- des fourrés de recolonisation du *Rubo-Prunetum mahaleb laburnetosum* ;
- les fourrés à Genévriers communs (*Juniperus communis*) ;
- des prairies mésophiles calcicoles du *Lolio-Cynosurion* ;
- des bois de pente du *Carpinion betuli* ;
- les hêtraies thermophiles du *Cephalanthero-Fagion*, très localisées ;
- les hêtraies neutrophiles à Aspérule ;
- des plantations de conifères et bois de feuillus.

La ZNIEFF de type II "Haute et moyenne vallée de la Somme ; entre Croix-Fonsommes et Abbeville" contient les ZNIEFF de type I suivantes :

- haute vallée de la Somme, à Fonsommes ;
- marais d'Isle et d'Harly ;
- marais de Saint-Simon ;
- marais de la haute vallée de la Somme, entre Voyennes et Cléry-sur-Somme ;
- marais de la vallée de la Cologne, aux environs de Doingt ;
- méandres et cours de la Somme, entre Cléry-sur-Somme et Bray-sur-Somme ;
- méandres et cours de la Somme, entre Bray-sur-Somme et Corbie ;
- marais et larris de Daours/Corbie ;
- marais de la vallée de la Somme, entre Daours et Amiens ;
- marais de la vallée de la Somme, entre Ailly-sur-Somme et Yzeux ;
- vallée d'Acon à La Chaussée-Tirancourt ;
- marais de la vallée de la Somme, entre Crouy-Saint-Pierre et Pont-Rémy ;
- marais de la vallée de la Somme, entre Eaucourt-sur-Somme et Abbeville ;
- réseau de coteaux de la vallée de la Somme, entre Curlu et Corbie ;
- larris de la vallée de la Somme, entre Dreuil-lès-Amiens et Crouy-Saint-Pierre ;
- larris de la vallée de la Somme, entre Bourdon et Yzeux ;
- larris d'Hangest-sur-Somme ;
- larris de la vallée de la Somme, entre Long et l'Etoile ;
- larris de la vallée de la Somme, entre Longpré-les-Corps-Saints et Liercourt ;
- larris de la vallée de Nielle, à Cocquerel ;
- larris des « Monts de Caubert » et cavités souterraines de Mareuil-Caubert et de Yonval.

INTERET DES MILIEUX

Ce corridor naturel unique en Europe offre un dégradé de conditions climatiques, depuis l'atlantique atténué jusqu'au subcontinental. La plupart des habitats présentent un intérêt exceptionnel pour la Picardie et accueillent de très nombreuses espèces remarquables. Cette zone présente un intérêt de niveau européen tant pour les groupements végétaux que pour la flore et la faune.

La vallée de la Somme présente un intérêt exceptionnel pour l'accueil d'oiseaux nicheurs rares et forme un couloir de passage apprécié des espèces migratrices.

Elle constitue une limite pour de nombreuses espèces thermophiles qu'on ne retrouve quasiment plus (ou en faible abondance) au nord, telles que la Globulaire (*Globularia bisnagarica*) et la Pulsatille commune (*Pulsatilla vulgaris*).

De nombreux milieux présents sont reconnus d'intérêt communautaire et inscrits, à ce titre, à la directive "Habitats" :

- des herbiers pionniers à Characées (*Charetalia hispidae*) ;
- des voiles de lentilles d'eau (*Lemno-Spirodeletum polyrhizae*) ;
- des herbiers aquatiques du *Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae*, présent uniquement, en Picardie, dans les grandes vallées tourbeuses ;
- des herbiers du *Lemno trisulcae-Utricularietum vulgaris* ;
- des herbiers du *Potamo berchtoldii-Najadetum marinae* ;
- des herbiers nageants de l'*Hottonietum palustris* ;
- des herbiers nageants de l'*Hippuridetum vulgaris* ;
- des herbiers nageants de l'*Hydrocharietum morsus-ranae* ;
- des herbiers des vasques tourbeuses du *Potametum colorati* ;
- des herbiers nageants du *Sparganio emersi-Potametum interrupti* ;
- la végétation pionnière de rives exondées du *Cyperetum flavescenti-fusci* ;
- le gazon subcontinental de l'*Eleocharietum acicularis*, très localisé ;
- les banquettes amphibies de l'*Hydrocotylo vulgaris-Baldellion ranunculoidis* ;
- les bas-marais tourbeux du *Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae* ;
- les bas-marais tourbeux alcalins de l'*Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi* ;
- les cladaies turfiques, très localisées ;
- les roselières tourbeuses du *Thelypterido palustris-Phragmitetum*, dont les localités picardes sont les mieux conservées de France ;
- les roselières tourbeuses du *Lathyro palustris-Lysimachietum vulgaris* ;
- les mégaphorbiaies tourbeuses du *Thalictrum flavi-Filipendulion ulmariae* ;
- les prairies tourbeuses du *Selino carvifoliae-Juncetum subnodulosi* ;
- les aulnaies-frênaies du *Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae* ;
- les bétulaies à Sphaignes du *Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis*, très rare et en danger de disparition en Picardie ;
- les pelouses calcicoles relevant de l'*Avenulo pratensis-Festucetum lemanii*, groupement végétal rare et menacé en Picardie, du fait de la disparition de l'élevage ovin, lequel permettait d'entretenir ces milieux herbacés. Plusieurs sous-associations, témoignant de conditions variées, sont présentes dans la zone, parmi lesquelles la sous-association "*blackstonietosum perfoliatae*" (variation atlantique atténuée) et la sous-association "*anthericetosum ramosi*" (affinités submontagnardes) ;
- les éboulis crayeux du *Rumici acetosae-Seslerietum caeruleae* sont exceptionnels en Picardie et témoignent de conditions submontagnardes. Précisons que la position submontagnarde de la Sesslerie, dans le nord de la France, est particulièrement originale par rapport au reste du territoire national, où elle est thermophile ;
- les éboulis crayeux hébergent le *Sisymbre couché* (*Sisymbrium supinum**), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- les fourrés à Genévriers communs (*Juniperus communis*) ;
- les hêtraies thermophiles du *Cephalanthero-Fagion*, très rare en Picardie et observées habituellement, pour le département de la Somme, au niveau de l'îlot thermophile Sud-Amiénois ;

- les hêtraies neutrophiles à Aspérule.

D'autres milieux ont un intérêt régional à national :

- les herbiers flottants du *Sparganietum minimi*, en grande régression en Picardie ;
- les roselières du *Scirpo lacustris-Phragmitetum*, qui accueillent une avifaune riche ;
- les cariçaies rivulaires du *Caricetum elatae*, du *Caricetum ripario-acutiformis*, du *Caricetum paniculatae* et du *Caricetum pseudocyperi* ;
- les cariçaies continentales du *Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi*, unité subcontinentale rarissime, qui est en limite occidentale de répartition ;
- les prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles oligotrophes du *Colchico autumnalis-Arrhenatherion elatioris* et du *Centaureo jaceae-Arrhenatherion elatioris*, exceptionnelles pour le département de la Somme ;
- les boisements humides du *Ribo nigri-Alnetum glutinosae*, rare et en régression en Picardie.

INTERET DES ESPECES

* Flore remarquable :

--> En fond de vallée, sont notés (nous ne citons ici que les espèces protégées) :

- la Renoncule langue (*Ranunculus lingua**), rare en France ;
- le Peucedan des marais (*Peucedanum palustre**), bien représenté dans cette zone ;
- le Potamot coloré (*Potamogeton coloratus**), typique des gouilles tourbeuses aux eaux alcalines ;
- le Rubanier nain (*Sparganium natans**), rare en Picardie ;
- le Ményanthe trèfle d'eau (*Menyanthes trifoliata**), se développant sur les tremblants tourbeux ;
- l'Eleocharide pauciflore (*Eleocharis quinqueflora**), espèce pionnière des tourbières basiclines ;
- la Linaigrette à feuilles étroites (*Eriophorum angustifolium**), vulnérable en Picardie ;
- la Stellaire des marais (*Stellaria palustris**), rare et vulnérable en Picardie ;
- le Dactylorhize négligé (*Dactylorhiza praetermissa**), typique des prairies humides non amendées ;
- le Dactylorhize incarnat (*Dactylorhiza incarnata**), rare et vulnérable en Picardie ;
- la Gesse des marais (*Lathyrus palustris**), exceptionnelle en Picardie ;
- la Pédiculaire des marais (*Pedicularis palustris**), inféodée aux zones de tourbes oscillantes ;
- l'Eleocharide épingle (*Eleocharis acicularis**), très rare en Picardie ;
- la Laîche arrondie (*Carex diandra**), exceptionnelle en Picardie ;
- la Véronique à écussons (*Veronica scutellata**), bien représentée en vallée de la Somme ;

- l'Utriculaire commune (*Utricularia vulgaris**), espèce exceptionnelle et en danger en Picardie ;
- la Laîche filiforme (*Carex lasiocarpa**), très rare et en danger en Picardie ;
- la Ciguë vireuse (*Cicuta virosa**), caractéristique des cariçaies pionnières sur les vases exondées ;
- l'Ophioglosse commune (*Ophioglossum vulgatum**), fougère prairiale particulièrement menacée ;
- la Fritillaire pintade (*Fritillaria meleagris**), qui s'observe dans les environs d'Abbeville. Il s'agit de son unique secteur de présence pour toute la Picardie. Elle y forme des populations relictuelles, dispersées sur plusieurs micro-sites. Ces stations représentent un remarquable isolat de population.
- l'Ache rampante (*Apium repens**), espèce inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- la Gentiane pneumonanthe (*Gentiana pneumonanthe**), espèce des molinaies, exceptionnelle en Picardie ;
- la Berle à larges feuilles (*Sium latifolium**), assez rare en Picardie ;
- l'Euphorbe des marais (*Euphorbia palustris**), espèce typique des mégaphorbiaies tourbeuses ;
- le Mouron délicat (*Anagallis tenella**), présent notamment sur les berges de certaines mares ;
- le Gymnocarpion du chêne (*Gymnocarpium dryopteris**), exceptionnel et en danger en Picardie ;
- le Dryoptéride à crête (*Dryopteris cristata**), dont les populations sont ici parmi les plus importantes de France.

D'autres espèces étaient également présentes par le passé, mais semblent avoir disparu aujourd'hui. C'est le cas du Potamot des Alpes (*Potamogeton alpinus**), exceptionnel en Picardie ; du Luronium nageant (*Luronium natans**), disparu de Picardie ; du Faux-nénuphar pelté (*Nymphoides peltata**), présumé disparu de Picardie ; de la Pyrole à feuilles rondes (*Pyrola rotundifolia**), très rare en Picardie, et du Gaillet boréal (*Galium boreale**), espèce continentale en isolat d'aire sur le site.

Plusieurs espèces de Sphaignes de grand intérêt ont également été observées parmi lesquelles : *Sphagnum capillifolium*, *Sphagnum fimbriatum*, *Sphagnum flexuosum*, *Sphagnum palustre*, *Sphagnum squarrosum*, *Sphagnum subnitens* et *Sphagnum papillosum* var. *laeve*.

--> Les coteaux calcaires abritent également de nombreuses espèces d'intérêt patrimonial élevé :

- la Phalangère rameuse (*Anthericum ramosum**), espèce rare en Picardie ;
- l'Orobanche élevée (*Orobanche major**), espèce thermophile exceptionnelle en Picardie ;
- le Polygala chevelu (*Polygala comosa**), espèce thermophile rare en Picardie ;
- la Sésélière bleuâtre (*Sesleria caerulea**), graminée montagnarde exceptionnelle et vulnérable en Picardie ;
- l'Alisier de Fontainebleau (*Sorbus latifolia**), arbuste thermophile ;
- l'Ophrys araignée (*Ophrys sphegodes**), rare et en danger en Picardie ;
- le Sisymbre couché (*Sisymbrium supinum**), espèce inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats" de l'Union Européenne ;
- l'Herminion caché (*Herminium monorchis**), espèce très rare en Picardie ;
- la Parnassie des marais (*Parnassia palustris**), espèce typique des sols marneux.

De nombreuses autres espèces végétales remarquables ont également été notées sur la zone : le Séséli libanotide (*Seseli libanotis*), assez rare en Picardie ; l'Ophrys frelon (*Ophrys fuciflora*), très rare dans le département de la Somme ; l'Acéras homme-pendu (*Aceras anthropophorum*), rare en Picardie ; l'Orchis militaire (*Orchis militaris*) ; l'Ophrys mouche (*Ophrys insectifera*) ;

l'Epipactis brun rouge (*Epipactis atrorubens*) ; la Digitale jaune (*Digitalis lutea*), assez rare en Picardie ; le Polygala d'Autriche (*Polygala amarella*), rare et vulnérable en Picardie,...

* Avifaune remarquable :

Citons :

- le Butor étoilé (*Botaurus stellaris*), inscrit à la directive "Oiseaux", en situation critique en Europe, en France comme en Picardie ;
- le Blongios nain (*Ixobrychus minutus*), inscrit à la directive "Oiseaux", dont les populations picardes sont parmi les plus importantes de France ;
- le Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*), exceptionnel en Picardie, qui a niché quelques années près de Péronne ;
- le Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*), rapace inscrit à la directive "Oiseaux" ;
- la Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*), inscrite à la directive "Oiseaux", qui a colonisé la vallée à la fin des années 80 ;
- la Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*), inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Picardie ;
- la Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) et la Locustelle lusciniôïde (*Locustella luscinioides*), passereaux paludicoles assez rares en Picardie ;
- la Marouette ponctuée (*Porzana porzana*), espèce en danger en France, inscrite à la directive "Oiseaux" ;
- la Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*), en voie d'extinction en Picardie à la suite du boisement des grandes roselières et de la disparition des prairies ;
- la Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*), espèce exceptionnelle dans le département de la Somme ;
- le Canard souchet (*Anas clypeata*), nicheur rare en Picardie ;
- la Sarcelle d'été (*Anas querquedula*), nicheur très rare en Picardie ;
- le Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*), nicheur rare à l'intérieur des terres ;
- le Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*), inscrit à la directive "Oiseaux" ;
- le Râle d'eau (*Rallus aquaticus*), assez rare en Picardie ;
- la Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*), espèce en régression, typique des milieux bocagers ;
- l'Hypolaïs ictérine (*Hippolais icterina*), vulnérable en Picardie.

* Batrachofaune remarquable :

Citons :

- le Triton crêté (*Triturus cristatus*), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- le Triton alpestre (*Triturus alpestris*), vulnérable au niveau national ;
- le Pélodyte ponctué (*Pelodytes punctatus*), très rare en Picardie et vulnérable en France ;
- la Rainette verte (*Hyla arborea*), vulnérable au niveau national.

* Herpétofaune remarquable:

Signalons la présence de la Vipère péliade (*Vipera berus*), rare en Picardie.

* Entomofaune remarquable :

Pour les odonates, signalons :

- la Cordulie à corps fin (*Oxygastra curtisii**), exceptionnelle en Picardie, inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- la Cordulie à taches jaunes (*Somatochlora flavomaculata*), vulnérable en Europe ;
- le Sympétrum jaune d'or (*Sympetrum flaveolum*), odonate très rare en Picardie ;
- le Sympétrum noir (*Sympetrum danae*), très rare en Picardie ;
- l'Agrion scitulum (*Coenagrion scitulum*), odonate rare en Picardie ;
- l'Agrion délicat (*Ceriagrion tenellum*), typique des milieux tourbeux ;
- l'Orthétrum brun (*Orthetrum brunneum*), espèce très rare en Picardie.

Pour les lépidoptères, citons le Sphinx de l'Epilobe (*Proserpinus proserpina**), dont la chenille se nourrit dans les mégaphorbiaies ; la Leucanie paillée (*Mythimna straminea*) ; la Leucanie du Roseau (*Senta flammea*) ; la Topaze (*Diachrysa chryson*) ; l'Herminie crible (*Macrochilo cribrumalis*) ; la Noctuelle des roselières (*Arenostola phragmitidis*). Le Cuivré des marais (*Thersamolycaena dispar**), n'a pas été revu depuis les années soixante-dix. La régression des surfaces en prairie lui est fatal.

Plusieurs lépidoptères, en régression en Picardie et typiques des pelouses rases, ont été notés : le Fluoré (*Colias australis*), l'Argus bleu-nacré (*Polyommatus coridon*) et l'Azuré bleu-céleste (*Polyommatus bellargus*).

Pour les orthoptères, citons le Conocéphale des roseaux (*Conocephalus dorsalis*), espèce des prairies humides, peu abondante en Picardie.

* Ichtyofaune remarquable :

Citons :

- la Bouvière (*Rhodeus sericeus*), poisson inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- la Truite de mer (*Salmo trutta trutta*) ;
- la Truite de rivière (*Salmo trutta fario*) ;
- l'Anguille (*Anguilla anguilla*), en forte densité ;
- le Brochet (*Esox lucius*).

* Mammalofaune remarquable :

Citons :

- le Grand Rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- le Vespertilion à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*), vulnérable en France et inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;

- le Grand Murin (*Myotis myotis*), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- la Pipistrelle de Nathusius (*Pipistrellus nathusii*), rare à très rare en Picardie ;
- la Musaraigne aquatique (*Neomys fodiens*), assez rare en Picardie.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Les marais se caractérisent par un vieillissement quasi-généralisé, avec accélération de la dynamique à la fois arbustive et préforestière (boisement des roselières, apparition de mégaphorbiaies dans les prairies ...). Les espèces remarquables, inféodées aux milieux ouverts, en subissent les conséquences.
- Ces phénomènes de fermeture sont accélérés, soit par l'intervention humaine (plantations de peupliers) soit par la non-intervention (abandon des pratiques d'entretien des milieux ouverts telles que l'exploitation de la tourbe et la fauche des roseaux).
- Certains marais marquent une tendance à l'assèchement, qui s'explique par la réalisation de fossés à pouvoir drainant, les plantations de peupliers... Ceci entraîne la raréfaction, voire la disparition d'espèces hygrophiles remarquables.
- La qualité des eaux a conduit à une régression des espèces aquatiques inféodées aux eaux oligotrophes.
- Certains étangs ont tendance à s'envaser. Ce phénomène est provoqué en partie par les limons des plateaux, entraînés dans le cours d'eau par les pluies.
- Le développement des Habitats Légères de Loisirs (HLL) entraîne une dégradation tant paysagère qu'écologique des marais.
- Les opérations de curage des étangs se réalisent parfois aux dépens des milieux palustres rivulaires (dépôts des boues de curage sur les berges...).
- L'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires entraîne une dégradation de la végétation des prairies. Le pâturage mis en oeuvre dans les prairies humides mériterait d'être davantage adapté aux caractéristiques écologiques de la zone.
- Certaines pelouses calcicoles ont tendance à être envahies par les hautes herbes et les broussailles, du fait de l'absence d'entretien. Ceci entraîne la régression des espèces héliophiles remarquables. Notons que ce phénomène est en partie ralenti par l'activité des lapins.
- Certains larris, actuellement pâturés, mériteraient de bénéficier d'un pâturage davantage extensif.
- L'utilisation d'intrants sur les cultures du plateau est préjudiciable à la flore pelousaire oligotrophe à la suite du ruissellement des produits et de leur transport par le vent.
- Certaines parcelles, originellement en nature de larris, ont été transformées en cultures.

N.B. : les espèces dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Réserve naturelle nationale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

+ 19 (gestion conservatoire), 13 (circulation ferroviaire).

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Etang
- Vallée
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

+ 30 (mare), 26 (méandre), 27 (bras mort), 29 (source), 61 (plateau).

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dorts - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone s'étend depuis les sources de la Somme à Croix-Fonsommes jusque Abbeville. Le reste de la basse vallée de la Somme (d'Abbeville à la baie de Somme) est rattaché à la ZNIEFF de type II "Plaine maritime picarde".

Elle correspond à la vallée de la Somme depuis le fond de vallée jusqu'aux convexités sommitales. Elle comprend le cours de la Somme et son lit majeur (complexe d'étangs, de marais, de prairies ...), les versants plus ou moins pentus de la vallée (les coteaux calcaires s'observent dans la partie de la vallée de la Somme comprise entre Péronne et Abbeville) ainsi que quelques vallées attenantes (vallée d'Acon par exemple).

Certains secteurs fortement anthropisés comme l'agglomération d'Amiens, les bassins de décantation de Vecquemont, les villes de Corbie, Peronne, Ham et Eppeville sont exclus de la zone.

L'ensemble de cette zone joue un rôle évident de corridor écologique et comprend une séquence remarquable d'habitats aquatiques et terrestres ainsi que des coteaux crayeux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Autoroute | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Voie ferrée, TGV | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les sols | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification des fonds, des courants | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Jachères, abandon provisoire | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes cultureux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Taille, élagage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Cueillette et ramassage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--------|---|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i> | | | 40 | |
| | 54.51 <i>Pelouses à Carex lasiocarpa</i> | | | | 2014 - 2015 |
| | 61 <i>Eboulis</i> | | | 5 | |
| | 53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i> | | | 5 | |
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | 20 | |
| | 24 <i>Eaux courantes</i> | | | 2 | |
| | 34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i> | | | 5 | |
| | 53.112 <i>Phragmitaies sèches</i> | | | 5 | 2014 - 2015 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 54 <i>Bas-marais, tourbières de transition et sources</i> | | | 5 | |
| | 44.911 <i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i> | | | 45 | 2014 - 2015 |
| | 37.715 <i>Ourlets riverains mixtes</i> | | | 1 | 2014 - 2015 |
| | 44.331 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières médio-européennes à eaux lentes à cerisiers à grappes</i> | | | 3 | 2014 - 2015 |
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | 4 | 2014 - 2015 |
| | 53.31 <i>Cladiales des bas-marais</i> | | | 1 | 2014 - 2015 |
| | 54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i> | | | | 2014 - 2015 |
| | 22.44 <i>Tapis immergés de Characées</i> | | | | 2014 - 2015 |
| | 22.412 <i>Radeaux d'Hydrocharis</i> | | | | 2014 - 2015 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 53.146 <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i> | | | | 2014 - 2015 |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | 10 | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | 3 | |
| | 86.413 <i>Carrières de pierres</i> | | | | |
| | 86.41 <i>Carrières</i> | | | 2 | |
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | 5 | |
| | 83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i> | | | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 2 | |
| | 41.3 <i>Frênaies</i> | | | 5 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 5 | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 15 | |
| | 89.22 <i>Fossés et petits canaux</i> | | | 2 | |
| | 89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | 5 | |
| | 88 <i>Mines et passages souterrains</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | 2 | |
| | 86.1 <i>Villes</i> | | | 2 | |
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | 1 | |
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | 1 | |
| | 83.321 <i>Plantations de Peupliers</i> | | | 8 | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 2 | |
| | 83.15 <i>Vergers</i> | | | 1 | |
| | 53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i> | | | 1 | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | 1 | |
| | 44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i> | | | 15 | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | 2 | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | 2 | |
| | 44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i> | | | 35 | 2014 - 2015 |
| | 22.4311 <i>Tapis de Nénuphars</i> | | | | 2014 - 2015 |
| | 53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i> | | | 5 | 2014 - 2015 |
| | 53.216 <i>Cariçaies à Carex paniculata</i> | | | 1 | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibiens</i> | | | 1 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | 5 | |
| | 31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i> | | | 2 | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | 5 | |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | 5 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.1 <i>Villes</i> | | | | |
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |
| | 5 <i>Tourbières et marais</i> | | | | |
| | 2 <i>Milieux aquatiques non marins</i> | | | | |
| | 3 <i>Landes, fruticées, pelouses et prairies</i> | | | | |
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |
| | 5 <i>Tourbières et marais</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Amphibiens | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rainette verte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 121 | <i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton alpestre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton crêté</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 179 | <i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Triton ponctué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| Bryophytes | 6007 | <i>Hylocomium brevirostre</i> (Brid.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 6216 | <i>Riccia fluitans</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 6237 | <i>Ricciocarpos natans</i> (L.) Corda | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 6728 | <i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 6746 | <i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 6747 | <i>Sphagnum fimbriatum Wilson</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 6748 | <i>Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 6760 | <i>Sphagnum magellanicum Brid.</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 6769 | <i>Sphagnum palustre L.</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 6789 | <i>Sphagnum squarrosom Crome</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 6790 | <i>Sphagnum subnitens Russow & Warnst.</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| Lépidoptères | 248827 | <i>Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)</i> | <i>Phalène de l'Arrête-Boeuf (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249380 | <i>Archanara geminipuncta (Haworth, 1809)</i> | <i>Nonagrie des Marais (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249055 | <i>Arctia villica (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249379 | <i>Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803)</i> | <i>Noctuelle des Roselières (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249370 | <i>Celaena leucostigma (Hübner, 1808)</i> | <i>Noctuelle de l'Iris (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 249536 | <i>Chilodes maritima</i> (Tauscher, 1806) | <i>Nonagrie du Phragmite (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 54386 | <i>Colias australis</i> Verity, 1911 | <i>Fluoré (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249147 | <i>Diachrysia chryson</i> (Esper, 1789) | <i>Plusie topaze (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 54271 | <i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 54265 | <i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761) | <i>Argus bleu- nacré (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249310 | <i>Macrochilo cribrumalis</i> (Hübner, 1793) | <i>Herminie pointillée (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249550 | <i>Mythimna straminea</i> (Treitschke, 1825) | <i>Leucanie paillée (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249341 | <i>Nonagria typhae</i> (Thunberg, 1784) | <i>Nonagrie de la Massette (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249515 | <i>Parastichtis suspecta</i> (Hübner, 1817) | <i>Xanthie falote (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249107 | <i>Pelosia obtusa</i> (Herrich- Schäffer, 1852) | <i>Lithosie obtuse (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 247135 | <i>Phragmataecia castaneae</i> (Hübner, 1790) | <i>Zeuzère du Roseau (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 249332 | <i>Phragmatiphila nexa</i> (Hübner, 1808) | Noctuelle à Baïonnette (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249136 | <i>Plusia putnami</i> (Grote, 1873) | Plusie des Laïches (La), Plusie des marais (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 54837 | <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772) | Sphinx de l'Épilobe (Le), Sphinx de l'Oenothère (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249330 | <i>Sedina buettneri</i> (E. Hering, 1858) | Noctuelle de la Brouille (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249544 | <i>Senta flammea</i> (Curtis, 1828) | Leucanie du Roseau (La), Feu-Follet (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 249088 | <i>Setina irrorella</i> (Linnaeus, 1758) | Endrosie diaphane (L'), Callimorphe arrosée (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| Mammifères | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Grand Murin | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Crossope aquatique, Musaraigne aquatique | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 60490 | <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | Pipistrelle de Nathusius | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| Odonates | 65415 | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 65123 | <i>Cercion lindenii</i> (Selys, 1840) | <i>Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 65169 | <i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 65145 | <i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 65131 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | <i>Agrion mignon</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 65290 | <i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 65284 | <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 65381 | <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834) | <i>Cordulie à corps fin</i> (La), <i>Oxycordulie à corps fin</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 65395 | <i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 65312 | <i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776) | <i>Sympétrum noir</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 65327 | <i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sympétrum jaune d'or (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 65348 | <i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| Oiseaux | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rousserolle turdoïde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'été</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 1956 | <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard chipeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule milouin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Butor étoilé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | <i>Petit Gravelot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | <i>Cygne tuberculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 4659 | <i>Emberiza cirrus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 4212 | <i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs icterine, Grand contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Butor blongios, Blongios nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie-grièche grise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | <i>Locustelle lusciniotide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 4023 | <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gorgebleue à miroir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Héron bihoreau, Bihoreau gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Cormoran</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 3039 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Marouette ponctuée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | 1905 |
| Orthoptères | 65878 | <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804) | <i>Conocéphale des Roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Phanérogames | 79816 | <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | <i>Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 79921 | <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753 | <i>Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 80980 | <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753 | <i>Bugle de Genève</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 81610 | <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799 | <i>Vulpin roux, Vulpin fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 82909 | <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | <i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 83215 | <i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag., 1821 | <i>Ache rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 85152 | <i>Atropa belladonna</i> L., 1753 | <i>Belladone, Bouton-noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse- renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 85946 | <i>Bidens cernua</i> L., 1753 | <i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Chlorette, Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 86983 | <i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753 | <i>Noix de terre, Marron de terre, Châtaigne-de-terre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 87218 | <i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789 | <i>Calamagrostide blanchâtre, Calamagrostide lancéolée, Calamagrostis lancéolé, Calamagrostis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 87471 | <i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | <i>Populage des marais, Sarbouillotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | Fort | | | |
| | 87652 | <i>Campanula glomerata</i> L., 1753 | <i>Campanule agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 87892 | <i>Cardamine amara</i> L., 1753 | <i>Cardamine amère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 88344 | <i>Carex appropinquata Schumach., 1801</i> | <i>Laïche paradoxale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 88463 | <i>Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808</i> | <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 88468 | <i>Carex diandra Schrank, 1781</i> | <i>Laïche arrondie, Laïche à tige arrondie, Laïche à deux étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 88477 | <i>Carex distans L., 1759</i> | <i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 88511 | <i>Carex flava L., 1753</i> | <i>Laïche jaunâtre, Laïche jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 88578 | <i>Carex hostiana DC., 1813</i> | <i>Laïche blonde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 88614 | <i>Carex lasiocarpa Ehrh., 1784</i> | <i>Laïche à fruit barbu, Laïche à fruit velu, Laïche filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 88624 | <i>Carex lepidocarpa Tausch, 1834</i> | <i>Laïche écailleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 88720 | <i>Carex nigra (L.) Reichard, 1778</i> | <i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 88752 | <i>Carex panicea L., 1753</i> | <i>Laïche millet, Faux Fenouil</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 88840 | <i>Carex rostrata Stokes, 1787</i> | <i>Laïche à bec, Laïche en ampoules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | <i>Laïche vésiculeuse,</i> <i>Laïche à</i> <i>utricules renflés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 88949 | <i>Carex viridula</i> Michx., 1803 | <i>Laïche tardive,</i> <i>Carex tardif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 89920 | <i>Cephalanthera</i> <i>damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906 | <i>Céphalanthère à</i> <i>grandes fleurs,</i> <i>Helléborine blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 90222 | <i>Ceratophyllum</i> <i>submersum</i> L., 1763 | <i>Cornifle submergé,</i> <i>Cératophylle</i> <i>submergé,</i> <i>Cératophylle</i> <i>inerte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 91199 | <i>Cicuta virosa</i> L., 1753 | <i>Cigüe aquatique,</i> <i>Cigüe vénéneuse,</i> <i>Cigüe vireuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse des prairies,</i> <i>Cirse Anglais,</i> <i>Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 91823 | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809 | <i>Marisque, Cladium</i> <i>des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 92899 | <i>Crataegus</i> <i>rhpidophylla</i> Gand., 1872 | <i>Aubépine à</i> <i>style bombé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 93621 | <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774 | <i>Cuscute à</i> <i>petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 93936 | <i>Cyperus</i> <i>fuscus</i> L., 1753 | <i>Souchet brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 94255 | <i>Dactylorhiza</i> <i>fistulosa</i> (Moench) H.Baumann & Künkele, 1983 | <i>Dactylorhize de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 94259 | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Orchis incarnat</i> , <i>Orchis couleur de chair</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 94273 | <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962 | <i>Orchis négligé</i> , <i>Orchis oublié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 94945 | <i>Digitalis lutea</i> L., 1753 | <i>Digitale jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 95889 | <i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe épingle</i> , <i>Héleocharis Épingle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 95927 | <i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz, 1949 | <i>Scirpe pauciflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | <i>Scirpe à une écaille</i> , <i>Héleocharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 96226 | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753 | <i>Épilobe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 96432 | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809 | <i>Épipactis rouge sombre</i> , <i>Épipactis brun rouge</i> , <i>Épipactis pourpre noirâtre</i> , <i>Helléborine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Épipactis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 96734 | <i>Erigeron acer</i> L., 1753 | <i>Vergerette acre</i> , <i>Érigeron âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 96844 | <i>Eriophorum angustifolium Honck., 1782</i> | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 97601 | <i>Euphorbia palustris L., 1753</i> | <i>Euphorbe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 98279 | <i>Festuca heteropachys (St.- Yves) Patzke ex Auquier, 1973</i> | <i>Fétuque à feuilles d'épaisseur variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 98977 | <i>Fritillaria meleagris L., 1753</i> | <i>Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 99922 | <i>Gentiana pneumonanthe L., 1753</i> | <i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 100215 | <i>Geum rivale L., 1753</i> | <i>Benoîte des ruisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 100338 | <i>Globularia bisnagarica L., 1753</i> | <i>Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 100584 | <i>Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869</i> | <i>Potamot dense, Groenlandia serré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 101315 | <i>Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813</i> | <i>Orchis musc, Herminium à un seul tubercule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 102189 | <i>Hieracium maculatum Schrank, 1789</i> | <i>Épervière tachée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 102870 | <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753 | <i>Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 103027 | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | <i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 103120 | <i>Hydrocharis morsus- ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 103267 | <i>Hypericum x desetangsii Lamotte, 1874</i> | <i>Millepertuis de Desétangs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 104155 | <i>Juncus compressus Jacq., 1762</i> | <i>Jonc à tiges comprimées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus Schränk, 1789</i> | <i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | Fort | | | |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | <i>Genévrier commun, Peteron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 105239 | <i>Lathyrus palustris</i> L., 1753 | <i>Gesse des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 105427 | <i>Lemna gibba L., 1753</i> | <i>Lentille d'eau bossue, Canillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 105433 | <i>Lemna minuta Kunth, 1816</i> | <i>Lentille d'eau minuscule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 106346 | <i>Linum tenuifolium L., 1753</i> | <i>Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 108345 | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753 | Trèfle d'eau, Méyanthe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 109151 | <i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753 | Myriophylle verticillé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 109213 | <i>Najas marina</i> L., 1753 | Naiade majeure, Naiade marine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 109419 | <i>Nasturtium microphyllum</i> Boenn. ex Rchb., 1832 | Cresson à petites feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 109750 | <i>Nymphaea alba</i> L., 1753 | Nénuphar blanc, Lys des étangs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 109769 | <i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891 | Limnanthème faux-nénuphar, Faux nénuphar, Petit nénuphar pelté | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | Oenanthe fistuleuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 109870 | <i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Coleman, 1844 | Oenanthe des fleuves, Oenanthe des rivières, Oenanthe des eaux courantes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 109881 | <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805 | Oenanthe de Lachenal | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 110392 | <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | <i>Ophrys bourdon</i> , <i>Ophrys frelon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 110477 | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | <i>Orchis militaire</i> , <i>Casque militaire</i> , <i>Orchis casqué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 111604 | <i>Orobanch</i> <i>major</i> L., 1753 | <i>Grande Orobanch</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 112413 | <i>Parietaria</i> <i>officinalis</i> L., 1753 | <i>Pariétaire officinale</i> , <i>Herbe à bouteille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 112426 | <i>Parnassia</i> <i>palustris</i> L., 1753 | <i>Parnassie</i> <i>des marais</i> , <i>Hépatique blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 112590 | <i>Pedicularis</i> <i>palustris</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire</i> <i>des marais</i> , <i>Tartarie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 112808 | <i>Petrorhagia</i> <i>prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 | <i>Oeillet prolifère</i> , <i>Petrorhagie</i> <i>prolifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 112873 | <i>Peucedanum</i> <i>palustre</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Peucedan des</i> <i>marais</i> , <i>Persil</i> <i>des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 114526 | <i>Polygala amarella</i> Crantz, 1769 | <i>Polygala amer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 114545 | <i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796 | <i>Polygala chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 115233 | <i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber, 1838 | <i>Potamot de Berchtold</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 115237 | <i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813 | <i>Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 115270 | <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753 | <i>Potamot luisant, Potamot brillant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 115296 | <i>Potamogeton perfoliatus</i> L., 1753 | <i>Potamot à feuilles perfoliées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 115305 | <i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753 | <i>Potamot fluet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 115998 | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | <i>Brunelle laciniée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 116109 | <i>Prunus padus</i> L., 1753 | <i>Cerisier à grappes, Putiet, Merisier à grappes, Putier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 116460 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Pulsatille vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 116979 | <i>Ranunculus circinatus</i> Sibth., 1794 | <i>Renoncule divariquée, Renoncule en crosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | <i>Grande douve, Renoncule Langue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 117255 | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785 | <i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 117587 | <i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777 | <i>Rhinanthe velu, Rhinanthe Crête-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 117590 | <i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel., 1806 | <i>Rhinanthe à grandes fleurs, Rhinanthe à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 117766 | <i>Ribes nigrum</i> L., 1753 | <i>Cassis, Groseille noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 119556 | <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | <i>Patience des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 119952 | <i>Salix aurita</i> L., 1753 | <i>Saule à oreillettes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 120040 | <i>Salix fragilis</i> L., 1753 | <i>Saule fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 140478 | <i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i> L., 1753 | <i>Saule rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 121735 | <i>Scirpus lacustris</i> L., 1753 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 121793 | <i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel., 1805 | <i>Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 122329 | <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762 | <i>Sélin à feuilles de carvi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 123032 | <i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Libanotis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 123071 | <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 | <i>Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 123905 | <i>Sisymbrium supinum</i> L., 1753 | <i>Braya couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 123960 | <i>Sium latifolium</i> L., 1753 | <i>Berle à larges feuilles, Grande berle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 124264 | <i>Sonchus palustris</i> L., 1753 | <i>Laiteron des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 124325 | <i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806 | <i>Alisier de Fontainebleau, Élorsier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 124407 | <i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871 | <i>Rubancier émergé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 124412 | <i>Sparganium natans</i> L., 1753 | <i>Rubancier nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 124771 | <i>Stachys germanica</i> L., 1753 | <i>Épiaire</i> d'Allemagne, Sauge molle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 125024 | <i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Stellaire des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 125976 | <i>Teucrium</i> <i>botrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée</i> <i>botryde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 126124 | <i>Thalictrum</i> <i>flavum</i> L., 1753 | <i>Pigamon jaune,</i> <i>Pigamon</i> <i>noircissant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 126298 | <i>Thesium</i> <i>humifusum</i> DC., 1815 | <i>Thésium couché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 127547 | <i>Triglochin</i> <i>palustris</i> L., 1753 | <i>Troscart des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à</i> <i>feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 128307 | <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810 | <i>Utriculaire citrine,</i> <i>Utriculaire élevée,</i> <i>Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 128322 | <i>Utricularia</i> <i>vulgaris</i> L., 1753 | <i>Utriculaire vulgaire,</i> <i>Utriculaire</i> <i>commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 128394 | <i>Valeriana</i> <i>dioica</i> L., 1753 | <i>Valériane dioïque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 128567 | <i>Verbascum</i> <i>densiflorum</i> Bertol., 1810 | <i>Molène faux-</i> <i>bouillon-</i> <i>blanc, Molène</i> <i>à fleurs denses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 128633 | <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779 | <i>Molène pulvérulente</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 129477 | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790 | <i>Dompte-venin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 130119 | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857 | <i>Lentille d'eau sans racine, Wolffie sans racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 142508 | <i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>palustris</i> L., 1753 | <i>Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| Poissons | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Anguille européenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 67143 | <i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barbeau fluviatile</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chabot, Chabot commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Brochet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 67420 | <i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782) | <i>Bouvière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 67778 | <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758 | <i>Truite de rivière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 67774 | <i>Salmo trutta trutta</i> Linnaeus, 1758 | Truite de mer | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| Ptéridophytes | 95561 | <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray, 1848 | Dryoptéris à crêtes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 96519 | <i>Equisetum fluviale</i> L., 1753 | Prêle des eaux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 100636 | <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman, 1851 | Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné, Lastrée du chêne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |
| Reptiles | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | Vipère péliade | Reproduction indéterminée | Informateur : Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | | | |

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|----------------------------|--|----------------------------|---|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | |
| Insectes | 54837 | <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 65381 | <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60490 | <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|--------|----------------------------|--|---------------------------|---|
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3039 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|--------------|----------------------------|---|---------------------------|---|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4023 | <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4212 | <i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 67143 | <i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 67420 | <i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 67774 | <i>Salmo trutta trutta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 67778 | <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Reptiles | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 98977 | <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 124325 | <i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Fougères | 95561 | <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray, 1848 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Mousses | 6728 | <i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw. | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|--------|----------------------------|---|---------------------------|--|
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6746 | <i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr. | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6747 | <i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6748 | <i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk. | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6760 | <i>Sphagnum magellanicum</i> Brid. | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6769 | <i>Sphagnum palustre</i> L. | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6789 | <i>Sphagnum squarrosum</i> Crome | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6790 | <i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst. | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| 3723 <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 82999 <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 84306 <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 85438 <i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 86490 <i>Briza media</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| 86601 <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 86983 <i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 87044 <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 88415 <i>Carex caryophylla</i> Latourr., 1785 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 89338 <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 91274 <i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 94945 <i>Digitalis lutea</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 97141 <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 97434 <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 97811 <i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 98334 <i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 99511 <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 99986 <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), WATTEZ J.-R. |
| 100607 <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 102189 <i>Hieracium maculatum</i> Schrank, 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 102352 <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 102797 <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 102842 <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---|
| 103609 <i>Inula conyzae</i> (Griess.) Meikle, 1985 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 104665 <i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 105502 <i>Leontodon hispidus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 106288 <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 106346 <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 106818 <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 110139 <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 113596 <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 114012 <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 114545 <i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 119418 <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 120753 <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 121334 <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), WATTEZ J.- R. |
| 123037 <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), WATTEZ J.- R. |
| 125981 <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 126298 <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 126564 <i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 127029 <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---|
| 127660 <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 129022 <i>Veronica teucrium</i> L., 1762 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | Anonyme | 1985 | Le marais de Blangy-Tronville. Canton de Boves. Un site écologique à protéger. - GEPOP, 15 p. |
| | Anonyme | 1986 | Projet de périmètre de protection de la réserve Naturelle Botanique : les marais de Mareuil-Caubert et d' Epagne-Epagnette (80). - AMBE, DRAE Pic., 128 p. |
| | Anonyme | 1989 | Etude écologique des Hortillonnages d'Amiens. - Soc. Linn. Nord-Pic., DRAE Pic., doc. non paginé. |
| | Anonyme | 1990 | Le marais des Hayettes à Daours (Somme). Etude floristique et écologique. - Société Linnéenne Nord Picardie, Cons. Rég. Pic., DRAE Pic., Amiens, 31 p. |
| | Anonyme | 1990 | Restauration et mise en valeur écologique des prairies humides du marais communal de Daours. Un projet de gestion original du Conservatoire des Sites Naturels de Picardie. - Cons.... |
| | Anonyme | 1992 | Prairie humide et coteau calcaire de la vallée d' Acon (La Chaussée-Tirancourt). Dossier de gestion. - Cons. Sites Nat. Pic., Min. Env., AREP, 46 p. + annexes. |
| | Anonyme | 1993 | Etude écologique de l'Arrêté de Protection de Biotope du Grand Marais de la Queue à Blangy-Tronville (Somme). 1ère phase... - Cons. Sites Nat. Pic., Cons. Rég. Pic., DIREN Pic., 29 p. |
| | Anonyme | 1994 | Avifaune de la vallée de la Somme (Ailly-sur-Somme/Abbeville). - Picardie-Nature, Amiens, 28 p. |
| | Anonyme | 1995 | Avifaune de la haute vallée de la Somme (Corbie/Saint-Simon). Rapport préliminaire. - Picardie-Nature, Cons. Sites Nat. Pic., doc. non paginé. |
| | BACROT S., BACROT M.-P., BOULLET V., JULVE P. et MERCIER E. | 1989 | Vallées de la Somme et de l'Ancre : Schéma d'aménagement touristique. - BIEA, AIDERA, Méricourt/Somme. |
| | BACROT S., BOULLET V. | 1985 | Etude des pelouses des Monts de Caubert. - BIEA, DRAE Pic., 58 p. |
| | BACROT S. et al. | 1984 | Aspect ornithologique de la vallée de la Somme. - Actes Coll. "L' Environnement en Picardie". - AMBE Pic., 93-99. |
| | BARDET O., DAS GRACAS E. | 1997 | Valorisation du patrimoine naturel en haute vallée de la Somme... - Cons. Sites Nat. Pic., avec la collab. de Pic. Nat. et du Cons. Bot. Nat. Bailleul, SVA, ..., 74 p |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--------------------------------------|----------------------|---|
| | BAZERQUE M.F. | 1987 | Sortie du 6 septembre. Les marais d'Hangest-sur-Somme. - Bull. Soc. Linn. N. Fr. de liaison n°4. |
| | BIGNON J.J. | 1995 | Contributions floristiques. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 13 : 70-78. |
| | BON M. | 1984 | Récoltes mycologiques (macromycètes) sur les pelouses calcaires de Picardie. - Actes Coll. "L'Environnement en Picardie" : 163-164, AMBE Pic. |
| | BON M. | 1990 | Dans les marais de Blangy-Tronville. Excursion botanique et mycologique du 17 septembre 1989 dirigée par M. BON, M. DUQUEF et G. SULMONT. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 8 : 198-200. |
| | BON M., CLAUS G. | 1980 | Compte-rendus d'excursions. La vallée de la Somme en amont d'Abbeville. 27 avril 1980. - Bull. Soc. Linn. N. Fr., nvelle série : 3. |
| | BON M., DOUCHET M., ROY C. | 1988 | Les environs de Longpré-les-Corps-Saints, la vallée de la Trie. Sortie du 9 août 1987. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 5 |
| | BOULLET V. | 1980 | Les pelouses calcaires et leur appauvrissement thermophile entre Seine et Somme. - DEA Lille II. Manuscrit 108 p., + 2 tab. |
| | BOULLET V. | 1986 | Les pelouses calcicoles (Festuco-Brometea) du domaine atlantique français et ses abords au nord de la Gironde et du Lot. - Thèse Sciences, Lille I, I : 333 p., II : tab. |
| | BOULLET V. | 1987 | Etude phytosociologique du méandre de Curlu-Vaux - Rapport provisoire - B.E.E.A. Méricourt / Somme. Doc. polycop., 12p. |
| | BOULLET V. | 1987 | La vallée de la Somme aux environs de Sailly-le-Sec et la région de Moreuil. Excursion botanique du 18/5/85. - Bull. Soc. Linn. N. Fr. de liaison n°4. |
| | BOULLET V. | 1990 | Contributions floristiques. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t.8, N.S. : 101-102. |
| | BOURNERIAS M. | 1975 | Inventaire écologique de l'Aisne. - Ministère de la Qualité de la Vie, 162 p. |
| | BRUNEL C. | 1983 | Etude éco-entomologique des zones humides de la Chaussée-Tirancourt (Somme). - DEA Lille, 104 p. |
| | BRUNEL C. | 1987 | Etude entomocoenotique le long d' un transect culture / coteau calcaire / vallée humide à La Chaussée-Tirancourt (vallée de la Somme)... - Thèse univ. de Lille. |
| | BRUNEL C., DUQUEF M. | 1984 | Les Libellules de Picardie (1ère note). - Bull. Soc. Sc. Nat. 42 : 1-6. |
| | CHAPUIS V., HERCENT J.L., MELENEC G. | 1997 | Larris d'Eclusier-Vaux (Somme). Plan de gestion 1998-2002. - Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, à paraître. |
| | CHAPUIS V., HERCENT J.L., MELENEC G. | 1997 | Vallée d'Acon, La Chaussée-Tirancourt (Somme). Plan de gestion 1998-2002. - Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, à paraître. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|----------------------------------|----------------------|--|
| | CHOISNET G. | 1997 | Synthèse bibliographique floristique et phytocoenotique de la Haute-Vallée de la Somme (Corbie à Croix-Fonsommes). - CRP /CBNBI, CSNP, 112 p. + annexes. |
| | COMMECY X., DUPUICH H. | 1983 | Une saison en Haute Vallée de la Somme. Le statut de quelques oiseaux d'eau. - L' Avocette 7 (1-2) : 63-85. |
| | COMMECY X., DUPUICH H. | 1985 | Statut de quelques espèces aquatiques nicheuses de la Haute Vallée de la Somme. - L' Avocette 9 (2-3) : 73-87. |
| | COMMECY X., SUEUR F. | 1978 | Migrations et hivernage des oiseaux aquatiques sur un étang de la haute vallée de la Somme : Cléry-sur-Somme. - L' Avocette 2 (2-3-4) : 82-93. |
| | DAS GRACAS E., FIERES V. | 1994 | Plan de gestion de la Réserve Naturelle des Marais d'Isle de Saint-Quentin. - Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, Direction Régionale de l'Environnement. |
| | DECOCQ G., WATTEZ J.R. | 1995 | Les marais de la haute vallée de la Somme. Excursion botanique du 19 juin 1994. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 13 : 133-139. |
| | DOUCHET M. | 1992 | Contributions floristiques. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 10 : 94-98. |
| | DOUCHET M. | 1994 | Le vallon d'Ornival à Sailly-le-Sec. Promenade botanique du 27 juin 1993. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 12 : 163-164. |
| | DUQUEF M., GAVORY L. | 1987 | Le marais de La Chaussée-Tirancourt : étude faunistique. - GEPOP, DRAE Picardie, 39 p. |
| | DUQUEF M., GAVORY L. | 1991 | Etude faunistique du marais et de la Falaise de Daours. - GEPOP, Cons. Rég. Pic., DRAE Pic., 34 p. |
| | ETIENNE P. | 1990 | Inventaire des zones humides de la Somme. - APCGDES, FDCS, 101 p. |
| | FERAUDY E. (de) | 1994 | Milieux humides de la moyenne vallée de la Somme. Tronçon Amiens Abbeville... - Cons. Sites Nat. Pic., Cons. Rég. Pic., 40 p. + annexes. |
| | FLIPO S., HAPPE D., HENDOUX F. | 1994 | Flore de Picardie menacée de disparition. Sauvegarde de 20 espèces végétales. - Centre Rég. de Phyto., Cons. Bot. Nat. Baill., Cons. Rég. Pic., vol. 1, 145 p. |
| | GAVORY L. | 1995 | Pour une politique de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel du district du grand Amiens. Fichier sitologique. - DESS Env., Univ. Amiens, mém. stage, 66. |
| | GAVORY L. | 1998 | Compte-rendu des observations ornithologiques 1994-1995. Site des Hortillonnages (Amiens, Camon et Rivery). - Synd. Intercom. pour l'Aménag. et la Sauveg. des Hortillonnages, 33 p. |
| | GAVORY L., BOULLET V., DUQUEF M. | 1990 | Etude préliminaire sur la création d'un centre de culture scientifique. Aspect environnement. Tome 1. ... - Cons. Sites Nat. Pic., Ville d'Amiens, 80 p. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|--|
| | GEHU J.M., BOULLET V., SCOPPOLA A., WATTEZ J.R. | 1982 | Essai de synthèse phytosociologique des pelouses sur craie du Nord-Ouest de la France. - Coll. Phytosoc. 11, les pelouses calcaires : 65-104... |
| | HERNANDEZ O. | 1990 | Schéma départemental de vocation piscicole du département de la Somme. - DDAF, FDAAPP, Min. Env., Cons. Rég. Picardie, Cons. Gén. Somme, Agence de l'eau Artois-Picardie. |
| | MELANT M. | 1996 | Contribution à l'étude des chauves-souris de la Somme. Le Vimeu. - Rapport de stage "BTS Gestion et Protection de la Nature-" Airion, CMNF. |
| | MERIAUX et al. | 1982 | Etude écologique de la basse vallée de la Somme en aval d' Amiens, entre Etouvie et La Chaussée-Tirancourt. - CETE Lille, AMBE, 5 p. + 1 plan au 1/500. |
| | MERIAUX J.L. | 1982 | Espèces rares ou menacées des biotopes lacustres et fluviales du nord-ouest de la France (Ptéridophytes et Spermatophytes). - Natura mosana, 34 : 178-194. |
| | MERIAUX J.L. | 1984 | Inventaire des sites naturels majeurs de Picardie. Le cas du département de la Somme. - Actes Coll. "L' Environnement en Picardie", AMBE Pic., 53-61. |
| | MERIAUX J.L. | 1984 | La végétation de la vallée de la Somme. - Actes Coll. "L' Environnement en Picardie", AMBE Pic., 81-91. |
| | MERIAUX J.L. | 1985 | Contribution à l'étude sociologique et écologique des végétations aquatiques et subaquatiques du nord-ouest de la France - Univ. de Metz - Thèse, 404 p. et 62 tableaux. |
| | MERIAUX J.L. | 1985 | Etude écologique approfondie des Marais d'Ile. - Association Multidisciplinaire des Biologistes de l'Environnement, Ville de Saint-Quentin, 42 p. |
| | MERIAUX J.L. | 1989 | Réserve Naturelle des Marais d'Ile. Flore et phytocoenoses. Qualité des eaux. - Association Multidisciplinaire des Biologistes de l'Environnement, Ville de Saint-Quentin, 42 p. |
| | MERIAUX J.L., TOMBAL P. | 1981 | Propositions pour la création d'une réserve naturelle. Les marais de Mareuil-Caubert. - AMBE, DRAE Pic., 56 p. |
| | MERIAUX J.L., WATTEZ J.R. | 1983 | Groupements végétaux aquatiques et subaquatiques de la vallée de la Somme. - Coll. Phytosoc. 10, les végétations aquatiques : 369-413. Lille. |
| | MONNIER D. et al. | 1997 | Résultat des pêches électriques dans le département de la Somme. - Direction Régionale du C.S.P. Compiègne, 2 p. |
| | PAGNIEZ P. | 1993 | Le marais de l' Etoile : diagnostic succinct et propositions de gestion (80). - Cons. Sites Nat. Pic., Cons. Gén. Somme, 10 p. |
| | QUETU G., WATTEZ J.R. | 1991 | Dans les marais de la Somme - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 9. : 19-21 |
| | RIGAUX T. | 1993 | Contributions à l' inventaire de la flore de la région Nord-Picardie. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 11 : 127-130. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|---|
| | SIMON M. | 1994 | Dans les marais de Daours (80). Sortie botanique du 19 septembre 1993. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 12 : 168-170. |
| | SIMON M. | 1995 | Contributions floristiques. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 13 : 92-94. |
| | SIMON M., WATTEZ J.R. | 1993 | Compte-rendu de l' excursion du 26 septembre 1992 dans la moyenne vallée de la Somme. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 11 : 169-171. |
| | SUEUR F. | 1985 | Classification des zones humides de la portion de la vallée de la Somme entre Erondelle et Amiens en fonction de leur intérêt avifaunistique. - Doc. multicop. GEPOP, 18 p. |
| | SUEUR F. | 1985 | Faune des marais de Mareuil-Caubert. - Doc. Multicop. GEPOP, 17 p. |
| | SUEUR F. | 1985 | Intérêt avifaunistique des marais de Mareuil-Caubert. - Doc. multicop. AMBE, 1 p. |
| | WATTEZ J.R. | 1974 | La Pédiculaire des marais, Pedicularis palustris L., dans le Nord de la France. - Les Naturalistes Belges 55 (6) : 241-257. |
| | WATTEZ J.R. | 1984 | Les pelouses calcicoles de la Picardie : l'intérêt de les protéger. - Actes Coll. "L'Environnement en Pic. |
| | WATTEZ J.R. et al. | 1985 | Les stations du Ranunculus lingua des régions littorales du Nord de la France et de la Picardie. Essai d'analyse comparative. - Bull. Soc. Bot. N. Fr., 134 (4-5) : 399-408 |
| | WATTEZ J.R. et al. | 1990 | Informations sur la présence de plantes légalement protégées dans le Nord de la France, la Picardie et leurs abords. - Bull. Soc. Linn. N. Fr., N.S., t. IV : 27-54. |
| | WATTEZ J.R., FOUCAULT B. (de) | 1982 | Les junipéraies calcicoles pionnières de la Picardie et du Nord de la France. - Coll. Phytosoc. 11, les pelouses calcaires : 613-627. Vaduz. |
| | WATTEZ J.R., FOUCAULT B. (de) | 1989 | L' Excursion de la Société Royale de Botanique de Belgique dans la vallée de la Somme, les 10 et 11 septembre 1988. - Bull. Soc. Roy. Belg. 122 : 115-124. |
| | WATTEZ J.R., PAGNIEZ P. | 1996 | Compte-rendu de l'excursion du 5 juin 1995. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 14 : 75-80. |
| | WATTEZ J.R., SULMONT G. | 1992 | Evolution de la flore des Hortillonnages d'Amiens à un siècle de distance (1890-1990). - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 10 : 5-13. |
| | WATTEZ J.R., WATTEZ A. | 1976 | Plaidoyer pour une protection des friches, coteaux et pelouses calcaires dans le département de la Somme. - Actes 101 ème congrès, Soc. Sav. Lille Sc., f. 1 : 279-290. |
| | WATTEZ J.R., WATTEZ A. | 1992 | Excursion dans les marais de la Somme près de Bourdon. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 10 : 129-130. |
| Informateur | ANTHEAUME P., YVINEC J.H., QUENEY P. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | BARDET O. (Picardie Nature) | | |
| | BAWEDIN V. (Picardie Nature) | | |
| | BOCQUILLON J.-C. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | |
| | BOULLET V. (Conservatoire Botanique National de Bailleul) | | |
| | BOUTINOT S. (Picardie Nature) | | |
| | CHAPUIS V. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | CHOISNET G. (Conservatoire Botanique National de Bailleul), FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | COMMECY X. (Picardie Nature) | | |
| | Coordination Mammalogique du Nord de la France | | |
| | DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | DELOISON G. (Picardie-Nature) | | |
| | DUBIE S., DURIEUX B. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) | | |
| | DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie), PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), PENAUD H. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0007. (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F., VAN HALUWYN C.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0007.0001 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0007.0002 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0007.0003 (1985) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0007.0004 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0007.0005 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0008.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., WATTEZ J.-R., COMMECY X., SUEUR F.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0010.0000 (1981) : A.M.B.E. (BRUNEL C., MERIAUX J.-L., SUEUR F.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0017.0000 (1981) : A.M.B.E. (WATTEZ J.-R., BOULLET V., DOUCHET M., SUEUR F., COMMECY X.) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | Fiche ZNIEFF 0019.0000 (1981) : A.M.B.E. (WATTEZ J.R., BOULLET V., DOUCHET M., BACROT S., COMMECY X., SUEUR F.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0021.0000 (1985) : A.M.B.E. (BACROT S., BON M., BOULLET V., COMMECY X., MERIAUX J.-L., SUEUR F.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0022.0000 (1985) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., BACROT S., COMMECY X., SUEUR F.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0025.0000 (1985) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0027.0000 (1982) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0028.0000 (1985) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0031.0000 (1985) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0037.0000 (1985) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., COMMECY X.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0038.0000 (1985) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., COMMECY X.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., COMMECY X.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0040.0000 (1981) : A.M.B.E. (BOURNERIAS M., COMMECY X., MERIAUX J.-L., TOMBAL P., VIGNEUX D., VIGNEUX E.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0042.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS M., BOUTINOT S., MERIAUX J.- L., VIGNEUX D., VIGNEUX E.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0140.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., BRUNEL C., DUQUEF M., GAVORY L.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0358.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0373.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0385.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ P.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0427.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., DUQUEF M.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ P.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0428.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., DUQUEF M., GAVORY L.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ P.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0429.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., BACROT S., COMMECY X.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | Fiche ZNIEFF 0430.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., DUQUEF M., BACROT S., COMMECY X.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ P.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0431.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., BACROT S., COMMECY X.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0432.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., BACROT S., COMMECY X.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0433.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., BACROT S., COMMECY X.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0434.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., BACROT S., COMMECY X.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0435.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0436.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., DUQUEF M., GAVORY L.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (FRANCOIS R.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0437.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.), DANCOISNE C. - complétée en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0438.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., DUQUEF M., GAVORY L.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ P.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0439.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., BACROT S., COMMECY X.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0440.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., BACROT S., COMMECY X.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0441.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., BACROT S., COMMECY X.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0442.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., BACROT S., COMMECY X.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (DAS GRACAS E.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0458.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) | | |
| | GAVORY L. (Picardie Nature) | | |
| | HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | HERRY J.-P. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | LE SCOUARNEC Y. (Picardie Nature) | | |
| | LEDROIT S. (Picardie Nature) | | |
| | MAIRE P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | MELENEC G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | RIGAUX T. (Picardie Nature) | | |
| | ROGER O. | | |
| | ROYER P. (Picardie Nature) | | |
| | SALVAN S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | VILLAIN C. (Réserve Naturelle des Marais d'Isle) | | |
| | Voir les sources des différentes ZNIEFF de type I incluses dans la ZNIEFF de type II | | |
| | WATTEZ J.-R. | | |